

Виагра - Инструкция по применению

Одобрено
Фармакологическим государственным
комитетом Минздрава России
9 июля 1998 г.

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ
(Информация для потребителей)
Виагра (силденафил)
Viagra (sildenafil)

Внимание! Препарат, который вы получили, является дженериком Виагры, то есть ее аналогом. Данная инструкция применима к Виагре и к любому ее дженерику.

Внимательно прочитайте эту инструкцию перед началом приема препарата.

- Сохраните инструкцию. Возможно, вы захотите прочитать ее еще раз.
- Если вам будет что-то непонятно или у вас возникнут дополнительные вопросы, то обратитесь к врачу или фармацевту.

1. Общие сведения о препарате.

1.1. Торговое (патентованное) название препарата

Виагра

1.2. Международное (непатентованное) название

Силденафил (в виде силденафила цитрата)

1.3. Лекарственная форма и назначение

Таблетки, покрытые оболочкой, для применения внутрь.

1.4. Состав

Активное вещество: силденафил (в виде силденафила цитрата) 25, 50 или 100 мг;
вспомогательные вещества: целлюлоза микрокристаллическая, кальция гидрофосфат (безводный), натрия кроскармеллоза, магния стеарат, пленочное покрытие Орадгу голубой и Орадгу прозрачный.

2. Показания к применению

Лечение нарушений эрекции, характеризующихся неспособностью к достижению или сохранению эрекции полового члена, достаточной для удовлетворительного полового акта. Силденафил эффективен только при наличии сексуальной стимуляции.

3. Противопоказания

Применение Виагры (силденафила) запрещено:

Виагра - Инструкция по применению

- лицам, не достигшим 18-ти лет;
- при гиперчувствительности к веществам препарата (силденафилу);
- одновременное применение виагры в любых дозах и формах с донаторами оксида азота или нитратами (Сустак, Нитроглицерин, Нитронг, Нитросорбид, Эринит и др.)
- одновременное применение виагры с афродизиаками: аминнитритами или нитритами (попперсами)
- при острой сердечной недостаточности, аритмии, артериальной гипертензии (артериальное давление (АД) > 170/100 мм рт. ст.;) или гипотония (АД <90/50 мм рт. ст.).
- при нестабильной стенокардии, а также мужчинам, перенесшим острый инфаркт миокарда, инсульт в последние 6 мес.

С осторожностью следует принимать при:

- различных заболеваниях сердца и сосудов;
- анатомических деформациях полового члена;
- серповидно-клеточной анемии (наследственной гемоглобинопатии);
- множественной миеломе (опухоли); лейкозе (заболевании костного мозга).

Применение при беременности и лактации.

По зарегистрированному показанию препарат не предназначен для применения у женщин.

Применение у детей.

Виагру не следует давать детям.

4. Способ применения и дозы.

Дозировка устанавливается индивидуально с учетом эффективности и переносимости.

Рекомендуемая разовая доза – 50 мг в сутки.

Максимальная доза – 100 мг в сутки.

Минимальная доза – 25 мг в сутки.

Применение минимальной дозы рекомендуется:

- Если вы старше 65 лет или имеете серьезные проблемы со здоровьем, с почками. Доза должна быть 25 мг.

- Если вы принимаете ингибитор протеазы, например, для лечения ВИЧ, вы должны принимать дозу 25 мг, не чаще 1 раз в 48 часов.

- Если у вас проблемы с простатой или высокое давление или вы принимаете альфа-блокаторы, также можно принимать только 25 мг.

Врач решит, в какой дозе вам следует принимать ВИАГРУ. Для большинства мужчин она составляет 50 мг. В более высокой дозе препарат следует принимать только по рекомендации врача

Принимайте Виагру за час, перед планируемым сексуальным актом. Начав действовать через 30 минут и на протяжении 4 часов, Виагра поможет вам с эрекцией, если вы сексуально возбуждены. Вы не сможете получить эрекции, просто приняв таблетку. Если

Виагра - Инструкция по применению

вы примите Виагру после употребления жирной пищи (например, чизбургер или фри) препарат может начать работу гораздо позже положенного срока.

5. Взаимодействие с другими лекарственными средствами.

Некоторые препараты могут изменить работу Виагры. Проконсультируйтесь с врачом прежде, чем принимать Виагру совместно с какими-либо лекарствами.

- Помните, Виагру нельзя принимать с препаратами, содержащими нитраты.
- Если вы принимаете препараты, называемые альфа-блокаторами, для лечения высокого давления или проблем с предстательной железой, ваше давление может резко снизиться. Вы можете почувствовать головокружение или слабость.
- Если вы принимаете ингибитор протеазы, ваша доза применения Виагры должна быть обязательно согласована с врачом.
- Виагра не должна использоваться с любыми препаратами, которые устраняют плохую эрекцию. Эти препараты включают: таблетки, средства, инъецированные в пенис, вакуумные помпы.
- Виагра содержит Силденафил, такое же вещество, как и в препарате Revatio. Revatio предназначен для лечения легочной гипертензии. Эти препараты нельзя принимать одновременно.

6. Побочное действие.

Силденафил (Виагра), как правило, хорошо переносится как при первичном, так и при повторных приемах. В отдельных редких случаях могут иметь место: головная боль, «приливы» крови к лицу, головокружение, диспепсия (нарушение пищеварения), заложенность носа, нарушение цветовосприятия синих и зеленых оттенков, гиперчувствительность к свету. Если у вас возникнут любые нежелательные эффекты при приеме Виагры, которые не указаны в данной инструкции, обратитесь к врачу или фармацевту.

7. Условия хранения.

При температуре не выше 30°C , в сухом недоступном для детей месте.

8. Срок годности.

Не принимайте препарат после даты окончания срока годности, указанной на упаковке.

9. Условия отпуска из аптек.

По рецепту врача.